

Ротавирусная инфекция

повсеместно распространенное очень заразное вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта с развитием ротавирусного гастроэнтерита.

Источник инфекции

больной человек или вирусоноситель

Механизм передачи — фекально-оральный

Заражение происходит при контакте с больным или вирусоносителем через грязные руки, объекты внешней среды, через третьих лиц (например, ухаживающих за больными), при употреблении контаминированных пищи и воды.



Симптомы

- Повышение температуры тела
- Рвота
- Диарея

Обезвоживание – основное осложнение ротавирусной инфекции

Обезвоживание очень опасно для маленьких детей.

Первые признаки обезвоживания – вялость (иногда наоборот, беспокойство), отсутствие желания играть, снижение объема мочеиспускания. Характерен “симптом пустого подгузника” – отсутствие мочи после 2-3 часов сна ребенка.

При появлении признаков обезвоживания у ребенка следует немедленно обратиться за медицинской помощью

Прогноз заболевания при адекватном лечении и достаточной компенсации потерь жидкости благоприятный, длительность болезни, как правило, не превышает 5-7 дней.

Вакцинация против ротавирусной инфекции

проводится в рамках национального календаря профилактический прививок по эпидемическим показаниям и в рамках региональных календарей профилактических прививок.

Вакцины предназначены для иммунизации здоровых детей в возрасте от 6 недель до 32 недель с целью профилактики гастроэнтерита.

Вакцины предназначены для приема внутрь, содержат живые аттенуированные (ослабленные) штаммы ротавируса, которые, попав в организм, размножаются в тонком кишечнике человека.

Это приводит к формированию не только антител в крови, но и местного иммунитета в кишечнике.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908426

Владелец Михайлова Ольга Николаевна

Действителен с 11.10.2024 по 11.10.2025